

Rosiers du Valais - IV, 1932

par H. CHRIST

Rosiers d'Anniviers

Comme la course de la Soc. Murithienne s'est dirigée, en juillet 1932, dans cette vallée, MM. Ignace Mariétan et le Dr A. Becherer ont bien voulu y collectionner des rosiers.

Anniviers, botaniquement — et pour les rosiers en particulier — est moins riche que la vallée de Zermatt. Je n'ai pas encore vu d'Anniviers ni *R. montana* ni *R. cinnamomea* ni le type de *R. pomifera* qui, avec leurs hybrides, donnent leur cachet à d'autres régions du Valais. Par contre, le *R. coriifolia* Fries, ailleurs pas des plus fréquents, donne, par une fréquence générale, son caractère à Anniviers, et au centre de la vallée, sur une pente élevée mais très xérique, il y a une colonie d'un rosier des Alpes orientales : le *R. pendulina* var. *reversa* Chr. que M. Becherer y a déniché.

Je donne ici un compte rendu succinct des trouvailles notables de mes deux confrères.

***R. coriifolia* Fries.**

Très typique. Buisson vigoureux, élevé, feuilles assez écartées, folioles longues jusqu'à 3,8 cent., ovales allongées en pointe, dentelure simple mais irrégulière.

Hab. Vissoie 1210 m. glabrescent. Entre Ayer et Pont de Bois 1400 m.

***R. coriifolia* Fries var. *Anniviana* nov. var. Chr.**

Très xérique, dimensions réduites à la moitié, buisson bas, dense, rameaux nombreux, étendus. Bois brun grisâtre. Aiguillons vigoureux, peu courbés, les supérieurs courts, crochus. Feuilles rapprochées, pétiole à duvet gris, non aiguillonné. Folioles serrées, petites 2 à 2 ½ cent., largement ovales obtuses, dents profondes, irrégulièrement dédoublées. Face sup. vert terne, face inf.

grisâtre, pubescence dense, très courte. Tissu ferme herbacé non coriace. Pédoncule court, lisse, urcéole petit, ovale, nu. Sépales nus, à pointe linéaire non pennée, à appendices linéaires filiformes courts. Sépales étalés après l'anthèse, pétales chiffonnés, rose clair, styles courts peu poilus, *pas* saillant en capitule tomenteux ! Toute la plante *églanduleuse*.

Distingué du type par le port « *senticosus* », les sépales, les styles.

Hab. Répandu : Ayer 1430 m. Entre Mission et Ayer. Pont du Bois 1490 m. Mission 1320 m. : forme mollement pubescente, très petite. Le même entre Vissoie et St-Luc 1400 m. jusqu'à Zinal env. 1800 m. I. Mariétan.

R. pomifera Herrm. var. Grenieri Desegl.

Répandu, remplaçant la var. *recondita* Pug. qui paraît manquer. Je note une forme qui, par l'absence presque complète de l'hispidité même des ped. de l'urc. et des sép. offre une analogie avec la var. *Semproniana Favrat et Schimper* du Simplon (Christ Flora 56. 1874. 468). J'ai cité une forme semblable comme *R. Grenieri f. calvata* du Lœtschental, Bull. Murith. 42. 1925, p. 51.

On peut mentionner aussi comme

Lusus velutina

une plante se distinguant par un duvet du ped. et de l'urc. exubérant produit par un indument velouté d'acicules tendres longs de 3 mil.

Hab. parmi les rosiers nains à la localité fort xérique au dessus de St-Luc env. 1740 m. 1. Becherer.

R. Grenieri Desegl. var. minuta Bor. in Desegl. Essay Ros. 1861. 127 apud R. Keller Synops. 1905, p. 70.

Buisson nain de 2 Dec. très rameux, très aiguillonné, rameaux et feuilles très serrés, folioles souvent à 5, lancéolées 2 cent. et demi sur 1 cent. et demi, irrégulièrement dentelées et crénelées. Face sup. vert terne, à peine pubescente, face inf. gris cendré très velue. Diffère de la plante décrite in Bull. Murith. 1925, p. 71, trouvée par † Thellung au Stelli-See à 2500 m. (!) qui est plus petite, à folioles enroulées ovales couvertes d'une pubescence appliquée argentée.

R. pendulina L.

Cette esp. a été tranchée par R. Keller Synops. 1905 pg. 299

et 300 en deux sections d'après les dimensions et le pourtour des folioles :

A. à folioles *oblongues* assez grandes.

Ici R. K. place le gros des variétés de *R. pendulina*.

B. à folioles *largement ovales* jusqu'à orbiculaires, petites, assez semblables à *R. pimpinellifolia*.

Cette sect. B. ne contient que quelques var. localisées surtout dans les Alpes mérid. orientales. Pour la Suisse il faut y ranger les var. suivantes :

var. scabriuscula Chr. R. Schw. 1873. p. 61 de Zermatt.

var. curticens Chr. 1. cit. Engadine et Mex, Bas Valais, 1. Mariétan in Bull. Murith. 1925. 42. p. 4.

var. reversa Chr. 1. cit. Engadine, station à laquelle il faudra ajouter celle de l'Anniviers mentionnée ci-après :

***R. pendulina* L. var. *reversa* Chr. 1. cit.**

Petit buisson d'un demi-mètre, rameaux nombreux, dressés et étalés de 15 cent. aiguillons très nombreux, inégaux (hétérocanthie irrégulière) jusqu'à 1 cent. élargis et dilatés à la base, gris, souvent à pointe légèrement *courbée*. Pétioles allongés, té nus, à petites glandules. Folioles à 7 rarement à 9, distantes d'un tissu assez ferme, vert foncé, plus pâle à la face inf., souvent rougeâtres comme les rameaux, largement ovales obtuses, les inférieures souvent semi-circulaires, longues de 15 mill. Dentelure très petite, simple ou irrégulièrement double, dents petites serrées. Fleurs nombreuses, petites, diam. 2 à 3 cent. pétales largement ouverts, rouge, intense.

Péd. assez court, dressé, glabre, ainsi que l'urc. et le dos des sépales, rarement ces organes sont munis de glandules sétiformes à la base, plus rarement encore hispides. Sépales étalés après l'anthèse, plus tard fermés en haut, à bords un peu glanduleux et entourés d'un feutre blanc (qui du reste est commun à la plupart des var. de *R. pendulina*) allongés en longue pointe non pennée, un peu foliacée, sans appendices. Urcéole petit, ovale un peu lagéniforme. Styles non saillants, peu tomenteux.

Hab. Découvert par A. Becherer 28 mill. 32 au dessus de St-Luc, vers la lisière des mélèzes 1710 à 1740 m. Plante d'un aspect excessivement xérique à l'instar d'un rosier d'Orient ou d'Espagne.

R. pendulina L. Sect. **A. oblongue** R. K. cit.

est le rosier dominant à Zinal env. 1800 m. La plupart des spécimens y recueillis par Mariétan se distinguent par un manque d'hispidité faisant contraste avec ceux de nos Alpes moyennes ou du Jura : les organes floraux sont lisses ou pourvus seulement d'un petit duvet setiforme. Les urcéoles manquent de cet aspect lagénaire si fréquent ailleurs ; ils sont simplement ovales et même globuleux.

R. superpendulina × **Grenieri** Christ in Bull. Murith. 49. 1932, p. 33.

Cet hybride est très voisin de celui que j'ai décrit loc. cit. d'après une trouvaille de Denis Coquoz au Bas-Valais.

Toutefois, la plante d'Ayer est moins hispide, presque lisse. Folioles du pourtour de Grenieri, mais quelquefois à 9 Fl. très nombreuses, mais d'aspect plus ou moins stérile. La plante est plus ramassée que *R. recondita* × *pendulina* f. *Christi*. R. K. Synops. 1905, 322.

Hab. Ayer 1400 m. 1. Mariétan.

Pour mettre au complet la florule Rosaire d'Anniviers, trouvée en 1932, citons encore des pieds épars de *R. glauca* Vill. type et var. *complicata* Gren., tandis que *R. rubrifolia* Vill. n'a pas encore été signalé.
